ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO. EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, CONTACTAR O DISTRIBUIDOR.

Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação de um pesticida, a nossa resposabilidade limita-se apenas à qualidade do produto

Armazenamento e eliminação: Manter fora do alcance de crianças. Proteger do superaquecimento. Armazenar na embalagem original fechada, em local seco, fresco e ventilado. Não transportar e não guardar junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, etc. Não contamine e nem descarte nos sistemas de esgotos, piscinas, barragens, rios ou qualquer outra fonte de água. Em caso de necessidade de despejo entrar em contacto com autoridade local competente. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados pelas autoridades ambientais.

É proibida a reutilização e a reciclagem de embalagem vazia, ou o fraccionamento e reembalagem do produto.

Precauções:

- Não comer, beber ou fumar quando usar o produto.
- Apos o uso lavar bem as mãos, braços, e rosto com água e sabão.
- Não manusear o produto em caso de gestação e amamentação.
- Ao manusear o produto usar equipamentos de protecção pessoal (EPP), vestindo macacão, botas ou sapatos cobertos, avental, máscara facial, óculos de protecção, touca ou capacete, e luvas, com isso evitando qualquer contacto do corpo com o produto.

Distribuidor e detentor da marca:
AGRO SYSTEMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/nº, Condomínio Comercial Espaços
Avenida - Loja LPS 02, Bairro Talatona - Luanda - Angola.
Tel (+244) 939 633 130 - Email: geral@agrosystems.co.ao
www.agrosystems.co.ao

Fabricante:
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.
4th Floor, Building 5, Castd Innovation Plaza - No.150 Pubin Road
Jiangbei New Area - Nanjing 211800 - China

Nº do lote: AGRO20220617
Válido até JULHO DE 2024

ABASYSTEMS

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Insecticida agrícola com Registo Nº IN 349, do Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola.

ABASYSTEMS é indicado como acaricida e insecticida para as culturas do algodão, batata, beringela, café, citrinos, couve, feijão, maçã, mamão, melancia, melão, pepino, pimento, repolho, soja e tomate. Trata-se de um produto com amplo espectro de acção e longo poder residual, que combate, entre outros, a *Tuta absoluta* na cultura do tomate, e vários tipos de ácaros e de larvas em culturas diversas.

Substância activa:
ABAMECTINA 18 g/L - EC
Concentrado Emulsionável (EC)
Conteúdo: 1 Litro

Primeiros socorros: Aos primeiros sinais de envenenamento, como náuseas, vómito, dor-de-cabeça, tonturas, salivação e lacrimação, dificuldade de respirar, deve parar imediatamente o trabalho e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente a roupa e o equipamento de protecção pessoal (EPP), evitando o contacto com o produto.

- *Em caso de inalação:* leve a vitima para o ar fresco.
- *Em caso de contacto com a pele:* remover o produto com pedaço de tecido, lã ou papel macio, sem esfregar muito, lavando a parte contaminada com água e sabão.
- *Em caso de contacto com vestuário:* remover roupas e sapatos contaminados e lavar bem com água.
- *Em caso de contacto com os olhos:* imediatamente lavar os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa corrente.
- *Em caso de ingestão:* lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1kg de sorvente por kg de peso corporal).

Após os primeiros socorros, consultar um médico imediatamente.
É aconselhavel entregar o rótulo da embalagem ao médico.

Informações sobre a cultura e aplicação
Nunca exceder a dose recomendada

Cultura	Objecto Prejudicial	Dose de consumo L/ha	Volume de calda L/ha
Algodão	Ácaro-branco*(Polyphagotarsonemus latus)*, Ácaro-rajado*(Tetranychus urticae)*, Ácaro-verde *(Mononychellus planki)*, Ácaro-vermelho *(Tetranychus ludeni)*	0,45 - 0,75	450 - 600
Batata	Mosca-minadora*(Liriomyza huidobrensis)*	0,6 - 1,2	450 - 600
Café	Ácaro-vermelho*(Oligonychus ilicis)*	0,6 - 0,9	900 - 1000
	Bicho-mineiro*(Leucoptera coffeela)*	0,6 - 1,2	
Citrinos	Ácaro-branco*(Polyphagotarsonemus latus)*, Ácaro-da-falsa-ferrugem*(Phyllocoptruta oleivora)*	0,6 - 0,9	900 - 1000
	Minadora*(Pyllocnistis citrella)*	0,8 - 1,2	
Feijão	Ácaro-branco*(Polyphagotarsonemus latus)*, Ácaro-vermelho*(Tetranychus cinnabarinus)*, Ácaro-verde *(Mononychellus planki)*	0,45 - 0,75	450 - 600
	Mosca-minadora*(Liriomyza huidobrensis)*	0,6 - 1,2	
Maçã	Ácaro-rajado*(Tetranychus urticae)*, Ácaro da maciei-ra/Acaro-vermelho-europeu*(Panonychus ulmi)*,	0,6 - 0,9	900 - 1000
Pimento	Ácaro-vermelho*(Tetranychus cinnabarinus)*	0,45 - 0,75	450 - 600
Repolho	Larva-minadora*(Liriomyza spp.)*	0,6 - 1,2	450 - 600
Soja	Ácaro-rajado*(Tetranychus urticae)*, Ácaro-verde *(Mononychellus planki)*	0,45 - 0,75	450 - 600
	Mosca-minadora*(Liriomyza huidobrensis)*	0,6 - 1,2	
Tomate	Ácaro-do-bronzeamento*(Aculops lycopersici)*,Ácaro-rajado*(Tetranychus urticae)*, Ácaro-verde *(Mononychellus planki)*, Ácaro-vermelho *(Tetranychus cinnabarinus)*	0,45 - 0,75	450 - 600
	Larva-minadora*(Liriomyza spp.)*, Traça-do-tomateiro*(Tuta absoluta)*	0,6 - 1,2	

- Nº Máximo de aplicações: 2 (Café: uma aplicação)
- Intervalo de segurança: 3 dias para as culturas do pimento, repolho e tomate; 7 dias para citrinos; 14 dias para as culturas da batata, café, feijão, maçã e soja.
- Sem intervalo de segurança no algodão, pois trata-se de uso não alimentar.
- Utilizar a maior dose em lavouras com estágio de desenvolvimento mais adiantado.

CLASSE DE PERIGO: ||| (OMS)
Ligeiramente tóxico - Atenção

Distribuição Agro Systems