

ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADAMENTE O RÓTULO. EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, CONTACTAR O DISTRIBUIDOR.

Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação de um pesticida, a nossa responsabilidade limita-se apenas à qualidade do produto

Armazenamento e eliminação: Manter fora do alcance de crianças.

Proteger do superaquecimento. Armazenar na embalagem original fechada, em local seco, fresco e ventilado. Não transportar e não guardar junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, etc. Não contamine e nem descarte nos sistemas de esgotos, piscinas, barragens, rios ou qualquer outra fonte de água. Em caso de necessidade de despejo entrar em contacto com autoridade local competente. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados pelas autoridades ambientais.

É proibida a reutilização e a reciclagem de embalagem vazia, ou o fraccionamento e reembalagem do produto.

Precauções:

- Não comer, beber ou fumar quando usar o produto.
- Após o uso lavar bem as mãos, braços, e rosto com água e sabão.
- Não manusear o produto em caso de gestação e amamentação.
- Ao manusear o produto usar equipamentos de protecção pessoal (EPP), vestindo macacão, botas ou sapatos cobertos, avental, máscara facial, óculos de protecção, touca ou capacete, e luvas, com isso evitando qualquer contacto do corpo com o produto.

Distribuidor e detentor da marca:

AGRO SYSTEMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/nº, Condomínio Comercial Espaços
Avenida - Loja LPS 02, Bairro Talatona - Luanda - Angola.
Tel (+244) 939 633 130 - Email: geral@agrosystems.co.ao
www.agrosystems.co.ao

Fabricante:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.
4th Floor, Building 5, Castd Innovation Plaza - No.150 Pubin Road
Jiangbei New Area - Nanjing 211800 - China



BENZOSYSTEMS INSECTICIDA AGRÍCOLA

Insecticida agrícola com Registo Nº IN 350, do Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola.

BENZOSYSTEMS é um insecticida não sistémico contra um amplo espectro de larvas de lepidópteros, ou seja, lagartas que atacam as culturas, incluindo as do género *Spodoptera frugiperda*, conhecida como Lagarta-militar, assim como a *Helicoverpa*. O produto também é recomendável no controlo da *Tuta absoluta* no tomateiro. Com o efeito do insecticida, os insectos ficam paralisados irreversivelmente e deixam de se alimentar. A mortalidade de quase todos os insectos acontece até, mais tardar, 2 a 3 dias após a aplicação do produto.

Substância activa:
BENZOATO DE EMAMECTINA 19,8 g/L - EC
Concentrado Emulsionável (EC)

Conteúdo: 1 Litro



CLASSE DE PERIGO: || (OMS)
Moderadamente tóxico - Cuidado: prejudicial

- Primeiros socorros:** Aos primeiros sinais de envenenamento, como náuseas, vômito, dor-de-cabeça, tonturas, salivação e lacrimação, dificuldade de respirar, deve parar imediatamente o trabalho e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente a roupa e o equipamento de protecção pessoal (EPP), evitando o contacto com o produto.
- Em caso de inalação: leve a vítima para o ar fresco.
 - Em caso de contacto com a pele: remover o produto com pedaço de tecido, lâo ou papel macio, sem esfregar muito, lavando a parte contaminada com água e sabão.
 - Em caso de contacto com vestuário: remover roupas e sapatos contaminados e lavar bem com água.
 - Em caso de contacto com os olhos: imediatamente lavar os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa e corrente.
 - Em caso de ingestão: lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1kg de sorvente por kg de peso corporal). Atenção para não provocar vômito.

Após os primeiros socorros, consultar um médico imediatamente. É aconselhável entregar o rótulo da embalagem ao médico.

Informações sobre a cultura e aplicação Nunca exceder a dose recomendada

Cultura	Objecto Prejudicial	Dose de consumo L/ha	Volume de calda L/ha
Algodão	<i>Helicoverpa (Helicoverpa armigera)</i> , Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>),	0,6 - 0,75	450 - 600
Batata	<i>Helicoverpa (Helicoverpa armigera)</i> , Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Mosca-minadora, (<i>Liriomyza huldobrensis</i>)	0,6 - 0,75	450 - 600
Citrinos	<i>Helicoverpa (Helicoverpa armigera)</i>	0,9 - 1,125	900 - 1000
Feijão	<i>Helicoverpa (Helicoverpa armigera)</i> , Lagarta-falsa-medideira (<i>Chrysodeixis includens</i>)	0,6 - 0,75	450 - 600
Milho	Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0,6 - 0,75	450 - 600
Soja	<i>Helicoverpa (Helicoverpa armigera)</i> , Lagarta-das folhas (<i>Spodoptera eridania</i>), Lagarta-da-soja (<i>Anticarsia gemmatilis</i>), Lagarta-falsa-medideira (<i>Chrysodeixis includens</i>), Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0,6 - 0,75	450 - 600
Tomate	<i>Helicoverpa (Helicoverpa armigera)</i> , Traça-do-tomateiro (<i>Tuta absoluta</i>)	0,6 - 0,75	450 - 600
Trigo	<i>Helicoverpa (Helicoverpa armigera)</i> , Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>),	0,6 - 0,75	450 - 600

- Nº Máximo de aplicações: 2 - (Exceção para algodão e trigo com nº máximo de 3 aplicações.)
- Intervalo de segurança de 3 dias para a cultura do tomate; de 7 dias para as culturas da batata, feijão, milho, soja e trigo; de 14 dias para a cultura dos citrinos.
- Sem intervalo de segurança na cultura do algodão, pois trata-se de uso não alimentar.
- Intervalo de 7 dias entre as aplicações.
- O produto é tóxico para as abelhas.

Nº do lote: AGRO20220617
Válido até JULHO DE 2025

