



# MANCOSYSTEMS

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

**SUBSTÂNCIA ACTIVA: MANCOZEBE 800 g/kg – WP - PÓ MOLHÁVEL (WP)**  
**CONTEÚDO: 1 KG**

**Fungicida para uso agrícola com Registo N° FG 175, do Ministério da  
Agricultura e Pescas da República de Angola**

ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO. EM CASO DE DÚVIDA OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, CONTACTAR O DISTRIBUIDOR.

MANCOSYSTEMS é um fungicida de contacto, do grupo químico alquilenobis (ditiocarbamatos), de actividade preventiva, isto é, pulverização antes da doença ou na sua fase inicial. Ideal para o tratamento de várias culturas contra as doenças de alternaria, requeima, míldio, cercosporiose, antracnose, ferrugem e septoriose.

Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação de um pesticida, a nossa responsabilidade limita-se apenas à qualidade do produto.

**Armazenamento e eliminação:** Manter fora do alcance de crianças. Proteger do superaquecimento. Armazenar na embalagem original fechada, em local seco, fresco e ventilado. Não transportar e não guardar junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, etc. Não contamine e nem descarte nos sistemas de esgotos, piscinas, barragens, rios ou qualquer outra fonte de água. Em caso de necessidade de despejo entrar em contacto com autoridade local competente. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados e acordados com as autoridades ambientais. **É proibida a reutilização e a reciclagem de embalagem vazia, ou o fraccionamento e reembalagem do produto.**

#### Primeiros Socorros:

Aos primeiros sinais de envenenamento, como náuseas, vômitos, dor-de-cabeça, tonturas, salivação e lacrimação, dificuldade de respirar, deve parar imediatamente o trabalho e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente a roupa e o equipamento de protecção pessoal, evitando o contacto com o produto.

- *Em caso de inalação* : leve a vítima para o ar fresco.

- *Em caso de contacto com a pele* : remover o produto com pedaço de tecido, lã ou papel macio, sem esfregar muito, lavando a parte contaminada com água e sabão.

- *Em caso de contacto com o vestuário* : remover roupas e sapatos contaminados e lavar com água.

- *Em caso de contacto com os olhos* : imediatamente lavar os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa corrente.

- *Em caso de ingestão* : lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1 kg de sorvente por kg de peso corporal). Atenção para não provocar o vômito.



#### Distribuidor e detentor da marca:

AGRO SYSTEMS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.  
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/n°, Condomínio  
Comercial Espaços Avenida – Loja LPS 02 – Bairro Talatona –  
Luanda – Angola  
Tel (+244) 939 633 130 – Email: geral@agrosystems.co.ao  
www.agrosystems.co.ao



#### Fabricante:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.  
4th Floor, Building 5, Castd Innovation Plaza No. 150 Pubin  
Road – Jiangbei New Area – Nanjing 211800 – China

**N° do lote: AGRO20220617**

**Válido até Julho de 2025**



**CLASSE DE PERIGO: ||| (OMS)**  
**Ligeiramente tóxico - Atenção**



# MANCOSYSTEMS

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

**SUBSTÂNCIA ACTIVA: MANCOZEBE 800 g/kg – WP - PÓ MOLHÁVEL (WP)**  
**CONTEÚDO: 1 KG**

**Precauções:**

- Não comer, beber ou fumar quando usar o produto.
- Após o uso lavar bem as mãos, braços e rosto com água e sabão.
- Não manusear o produto em caso de gestação e amamentação.
- Ao manusear o produto usar equipamentos de protecção pessoal (EPP), vestindo macacão, botas ou sapatos cobertos, avental, máscara facial, óculos de protecção, touca ou capacete, e luvas, com isto evitando qualquer contacto do corpo com o produto.

Cultura	Objecto Prejudicial	Dose de Consumo kg/ha	Volume de Calda L/ha
Alho Cebola	Antracnose/Mancha-púrpura ( <i>Alternaria-porri</i> ), Míldio ( <i>Peronospora destructor</i> ), Ferrugem ( <i>Puccinia porri</i> )	2,25 - 3,75	450 - 600
Banana	Mancha-parda ( <i>Cercospora hayi</i> )	1,5 - 2,25	450 - 600
Brócolis Couve Couve-flor	Míldio ( <i>Peronospora parasitica</i> ), Pinta preta/Mancha-de-alternaria ( <i>Alternaria brassicae</i> )	2,25 - 3,75	450 - 600
Cenoura	Mancha-de-alternaria ( <i>Alternaria dauci</i> ), Queima-das-folhas ( <i>Cercospora carotae</i> )	2,25 - 3,75	450 - 600
Citrinos	Antracnose ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> ), Mancha-de-alternaria ( <i>Alternaria alternata f. citri</i> ), Verrugose ( <i>Elsinoe fawcetti</i> )	1,5 - 2,25	450 - 600
Feijão	Alternariose/Mancha-de-alternaria ( <i>Alternaria sp.</i> ), Antracnose ( <i>Colletotrichum lindenmuthianum</i> ), Mancha-angular ( <i>Phaeoisariopsis griseola</i> ),	2,25 - 3,75	450 - 600
Melancia Melão Pepino	Antracnose ( <i>Colletotrichum gloeosporioides/C. orbiculare</i> ), Míldio ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	2,25 - 3,75	450 - 600
Pimento	Antracnose ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> ), <i>Cercospora (Cercospora capsici)</i> , Requeima/Podridão da raiz ( <i>Phytophthora capsici/P. infestans</i> )	2,25 - 3,75	450 - 600
Tomate	Antracnose ( <i>Colletotrichum gloeosporioides/C. phomoides</i> ), Míldio ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ), Pinta-preta-grande/Alternariose ( <i>Alternaria solani</i> ), Requeima ( <i>Phytophthora infestans</i> ), Septoriose ( <i>Septoria lycopersici</i> )	2,25 - 3,75	450 - 600

- Pulverização preventiva para antes da doença ou na sua fase inicial.
- Intervalo de segurança:  
7 dias para as culturas do alho, brócolis, cebola, couve-flor, cenoura, melancia, pepino, pimento e tomate.  
14 dias para as culturas da couve, citrinos, feijão e melão.  
21 dias para a cultura da banana.
- Nº máximo de aplicações por um ciclo de crescimento: 3



**CLASSE DE PERIGO: ||| (OMS)**  
**Ligeiramente tóxico - Atenção**

