

ANTES DE UTILIZAR, LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO. EM CASO DE DÚVIDA, OU PARA MAIS ESCLARECIMENTOS, CONTACTAR O DISTRIBUIDOR.

Devido aos inúmeros factores que determinam o êxito na aplicação de um pesticida, a nossa responsabilidade limita-se apenas à qualidade do produto

Armazenamento e eliminação: Manter fora do alcance de crianças. Proteger do superaquecimento. Armazenar na embalagem original fechada, em local seco, fresco e ventilado. Não transportar e não guardar junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, etc. Não contamine e nem descarte nos sistemas de esgotos, piscinas, barragens, rios ou qualquer outra fonte de água. Em caso de necessidade de despejo entrar em contacto com autoridade local competente. Restos de pesticidas e embalagens vazias devem ser removidos e destruídos por um especialista autorizado, ou em locais designados pelas autoridades ambientais. **É proibida a reutilização e a reciclagem de embalagem vazia, ou o fracionamento e reembalagem do produto.**

Precauções:

- Não comer, beber ou fumar quando usar o produto.
- Após o uso lavar bem as mãos, braços, e rosto com água e sabão.
- Não manusear o produto em caso de gestação e amamentação.
- Ao manusear o produto usar equipamentos de protecção pessoal (EPP), vestindo macacão, botas ou sapatos cobertos, avental, máscara facial, óculos de protecção, touca ou capacete, e luvas, com isso evitando qualquer contacto do corpo com o produto.

Distribuidor e detentor da marca:

AGRO SYSTEMS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.
Avenida Presidente Samora Machel (Via S-8) s/nº, Condomínio
Comercial Espaços Avenida - Loja LPS 02, Bairro Talatona - Luanda - Angola.
Tel (+244) 939 633 130 - Email: geral@agrosystems.co.ao
www.agrosystems.co.ao

Fabricante:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.
4th Floor, Building 5, Castd Innovation Plaza - No.150 Pubin Road
Jiangbei New Area - Nanjing 211800 - China



Nº do lote: AGRO20221207
Válido até DEZEMBRO DE 2025



CLORPISYSTEMS INSECTICIDA AGRÍCOLA

Insecticida agrícola com Registo Nº IN 376, do Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola.

CLORPISYSTEMS é um insecticida com acção de contacto e ingestão, que começa a agir minutos após atingir a planta. Contém um longo período de protecção (durante duas semanas), funcionando igualmente bem durante o ciclo de vida das pragas, desde a larva até à fase adulta. O produto controla diversas culturas como batata, frutas cítricas, feijão, milho, tomate, etc. (ver tabela com descrição completa das culturas) contra ácaros, áfidos ou pulgões, cigarrinhas, lagartas, moscas, percevejos, tripses, etc.

Substância activa:
CLORPIRIFÓS 480 g/L – EC
Concentrado Emulsionável (EC)
Conteúdo: 1 Litro



Primeiros socorros: Aos primeiros sinais de envenenamento, como náuseas, vômito, dor-de-cabeça, tonturas, salvação e lacrimação, dificuldade de respirar, deve parar imediatamente o trabalho e retirar a vítima da zona de exposição do produto. Remova cuidadosamente a roupa e o equipamento de protecção pessoal (EPP), evitando o contacto com o produto.

- Em caso de inalação: leve a vítima para o ar fresco.
- Em caso de contacto com a pele: remover o produto com pedaço de tecido, lã ou papel macio, sem esfregar muito, lavando a parte contaminada com água e sabão.
- Em caso de contacto com vestuário: remover roupas e sapatos contaminados e lavar bem com água.
- Em caso de contacto com os olhos: imediatamente lavar os olhos (com as pálpebras abertas) com bastante água limpa corrente.
- Em caso de ingestão: lavar a boca com água, tomar alguns copos de água com suspensão de carvão activado (cálculo: 1kg de sorvente por kg de peso corporal). Atenção para não induzir o vômito.

Após os primeiros socorros, consultar um médico imediatamente. É aconselhável entregar o rótulo da embalagem ao médico.

Informações sobre a cultura e aplicação Nunca exceder a dose recomendada

Cultura	Objecto Prejudicial	Dose de consumo L/ha	Volume de calda L/ha
Alface:	Larva-minadora/ Mosca-minadora (<i>Liriomyza spp.</i>)	0,5 - 0,75	300 - 450
	Ácaro-branco (<i>Polypogonatoranemus latus</i>), Bico-do-aldgoeiro (<i>Anthonomus grandis</i>), Lagarta/ Broca-do-fruto (<i>Helicoverpa armigera</i>), Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Mosca-branca (<i>Bemisia tabaci</i>), Percevejo-castanho (<i>Scaptocoris castaneus</i> , <i>Scaptocoris spp.</i>), Pulgão/Áfidos (<i>Aphis gossypii</i>), Trips (<i>Frankliniella schultzei</i>)		
Algodão:		0,5 - 0,75	300 - 450
Arroz:	Cigarrinha-das-pastagens (<i>Deois spp.</i>)	0,5 - 0,75	300 - 450
Batata:	Lagarta-rosca (<i>Agratis ipsilon</i>), Larva-alfinete/Vaquinha-verde-amarela (<i>Diabrotica speciosa</i>)	0,5 - 0,75	450 - 600
Café:	Bicho-mineiro-do-café/ Larva-minadora (<i>Leucoptera coffeella</i>), Broca-do-Café (<i>Hypothenemus hampei</i>), Cochoniilha (<i>Planococcus minar</i>)	0,9 - 1,5	900 - 1200
Citrinos:	Áfidos/ Pulgão, Cigarrinha-dos-citros (<i>Acrogonia gracilis</i>), Cochonilhas (<i>Orthezia praelonga</i> , <i>Parlatoria cinerea</i> , <i>Selenaspis articulatus</i>), Mosca-das-frutas/ Mosca-do-mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>), Psilídeo (<i>Diaphorina citri</i>)	0,9 - 1,5	900 - 1200
Feijão:	Ácaros, Áfidos/ Pulgão, Cigarrinha-verde (<i>Empoasca kraemer</i>), Lagarta-das-vagens (<i>Etiella zinckenella</i>) Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Lagarta-rosca (<i>Agratis ipsilon</i>), Larva-minadora/ Mosca-minadora (<i>Liriomyza spp.</i>), Mosca-branca (<i>Bemisia tabaci</i>), Percevejo-verde (<i>Nematospora sp / Nezara viridula</i>), Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0,5 - 0,75	450 - 600
Maçã:	Lagarta-enroladeira-da-folha (<i>Bonapoga cranaodes</i>)	0,9 - 1,5	900 - 1200
	Ácaros, Áfidos/ Pulgão, Broca-do-caule/ Lagarta-elasma (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>), Broca-do-colmo (<i>Chilo partellus</i>), Broca-do-milho/ Traça (<i>Busseola fusca</i>), Cigarrinha-do-milho (<i>Dalbulus maidis</i>), Lagarta-desfolhadora/ Curuquerê-dos-capinzais (<i>Mocis latipes</i>), Lagarta-militar (<i>Spodoptera frugiperda</i>), Lagarta-rosca (<i>Agratis ipsilon</i>), Percevejos		
Milho:		0,5 - 0,75	300 - 450
Soja:	Broca-do-caule/ Lagarta-elasma (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>), Lagarta-falsa-medideira (<i>Pseudoplusia includens</i>), Lagarta-rosca (<i>Agratis ipsilon</i>), Lagartas (<i>Spodoptera spp.</i>), Mosca-branca (<i>Bemisia tabaci</i>), Percevejo-verde (<i>Nematospora sp / Nezara viridula</i>)	0,5 - 0,75	450 - 600
Tomate:	Áfidos/ Pulgão (<i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Larva-minadora/ Mosca-minadora (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), Mosca-branca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0,5 - 0,75	450 - 600

- Produto altamente perigoso para as abelhas (classe de perigo I).
- Nº máximo de aplicações: Citrinos: 1; Arroz, Batata, Café, Feijão, Maçã, Milho, Soja, Tomate: 2; Alface: 3; Algodão: 4.
- Intervalo de segurança: Maçã: 14 dias; Alface, Algodão, Arroz, Batata, Café, Citrinos, Milho, Soja, Tomate: 21 dias; Feijão: 25 dias.



CLASSE DE PERIGO: I I (OMS)
Moderadamente tóxico – Cuidado: prejudicial